

Yaprak Çizgi Hastalığı (*Drechslera graminea*):



Hastalık tarladaki bitkilerin tamamında görülmez. Tohum kökenli olduğu için ayrı ayrı bitkilerde ortaya çıkar ve ocaklar halinde genişler.



İlk hastalık belirtileri yaprağın ortası boyunca devam eden şeritler şeklinde olup, en erken tespiti bitkinin yan sürgünleri ortaya çıktığında olur.



Bazı türlerde ilk hastalık belirtileri ancak kardeşlenme aşamasında ortaya çıkar. Taze yapraklarda damar aralıklarında açık renkli şeritler oluşur ve bu şeritler daha sonra kahverengiye döner, boylamasına yarılırlar.

Birden fazla şerit paralel olarak oluşur, arada kalan dokunun rengi yavaş yavaş açılır. Sonrasında yapraklar kurur.

Bitkinin gelişmesinde gerileme gözlenir.

Başaklar çoğunlukla kılçıklarıyla birlikte yaprak kılıfında kalırlar veya dik dururlar. Bu durumda sadece hastalıklı tohumlar meydana getirirler veya boş kalırlar.

Hastalığın oluşmaması için, önlem amaçlı sertifikalı (kontrollü alanlarda yetiştirilen ve kontrolden geçmiş tohumluklar) tohumluk kullanılmalıdır.

Eğer sertifikasız tohum kullanılacak ise, tohumluklar mutlaka hastalığa ruhsatlı bir tohum ilacı ile ilaçlanmalıdır.

