

Ekin Bambul Böceđi (Anisoplia spp.)



Deđişik türleri vardır. Bazı türlerde baş ve gövde parlak madensel yeşil renkte, üst kanatların gövdeyle birleşme yerlerinin ortasında köşeli kara bir leke vardır. Üst kanatlar kahverengindedir. Bazı türler siyah renklidir. Antenleri yelpaze şeklindedir.

Erginler tahılın süt olum döneminde başaklar üzerinde görülür. Erginler günün sıcak saatlerinde çok aktiftirler. Erginlerin yaşam süresi 1-1,5 aydır. Genellikle 2 yılda bir kez döl verir. Ancak şartlar uygun olduğunda, döl verdikten sonraki takip eden yılda da döl verebilir.

Erginleri hububatın süt olum döneminde başaklardaki taneleri, toprak altında ise hububatın kökünü kemirerek zarara yol açarlar.

Buğday, arpa, yulaf ve çavdar ekili alanlarda zarara yol açarlar. Zararın görüldüğü alanlarda hasattan sonra toprak derin sürülmelidir. Bununla birlikte baklagillerle münavebe yapılması, zararlıyla mücadelede önemli bir yöntemdir.

Erginlere karşı yüzey ilaçlaması yapılmalıdır. Bunun için ilk ergin çıkış zamanının doğru saptanması ekonomik zarar açısından önem arz etmektedir. Metrekarede 3-4 ergin veya sonbaharda 3-4 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.



2A TOHU...SULUK