

# ALTERNARIA (Yaprak yanıklığı)

## Alternaria triticina



Sarı sınırlarla çevrelenmiş küçük, oval veya elips şeklinde kahverengi lezyonlar olarak yaprak üzerinde dağınık halde görülür. (Önemli not: genellikle septoria ile çok benzerdir. Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, septoria da oluşan lekeler genel olarak yaprak damarları ile sınırlandırılmış şekildedir.)



Daha sonra bu dağınık lezyonlar birleşerek yaprak üzerinde daha büyük lezyonlara dönüşür. Enfeksiyon genellikle yaşlı (alt) yapraklarda başlar. Ancak hastalığın ilerlemesi durumunda, belirtiler tüm bitki parçaları üzerinde görülebilir.



Tanede oluşturduđu tahribat ise, özellikle embriyo kısmında yer alan dış kabuğun kararması şeklinde görülür. (Tanede embriyo kararmasına sebep olan dört mantar türünden biridir.)

Önemli denebilecek bir verim kaybına neden olmaz. Ancak un kalitesini düşürür. Bu yüzden değer kaybı oluşacağından dolayı sertifikalı tohum kullanılmalı ve alınan sertifikalı tohumda kullanılan ilacın bu hastalığa ruhsatlı olmasına dikkat edilmelidir.